MAPA GEOLÓGICO DA FOLHA ITAGUAÍ-MARAMBAIA

ESCALA 1:50 000

1982

PROJETO CARTA GEOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

SOUSA NEGRÃO	PIRAÍ	PARACAMBI	
BARRA MANSA	ITAGUAÍ	SANTA CRUZ	
ILHA GRANDE	MANGARATIBA		

Serviços e cargo de GEOSOL–Geologia e Sondagens Ltda
Equipe Executora — Chefe de Serviço: J. H. Gossi Sad
Coordenador: A. Lúcio M. Barbosa
Geólogo: Clóton P. Pinto e Rondolo M.P. de Silva
Supervisão: DRM

Nota: As divisões adotadas nesta folha seguem os recomendações do I Seminário sobre critérios de mapeamento geológico e nomenclatura de Unidades do Pré-Cambriano no Estado do Rio de Janeiro e áreas limítrofes realizado em Niterói - RJ., em 1978.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS

DRM-RJ

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS

ITAGUAÍ – MARAMBAIA
SF-23-Z-A-VI-3 — SF-23-Z-C-III-1

LEGENDA

QUATERNÁRIO

- **A1** — Aterro artificial
- **a** — Aluvião: depósitos fluviais de argila, areia e cascalho, em parte retrabalhados na faixa litorânea
- **cm** — Depósito marinho predominantemente arenoso; linha chata indica lagunas associadas
- **q1** — Depósito misto em lagunas, com vegetação, argila e matéria orgânica; destacam-se as principais feições locais (▽▽▽) em parte ou totalmente assoreadas
- **ca** — Depósito eólico arenoso
- **co** — Depósito de mangue, argila - arenoso com elevada contribuição orgânica, periodicamente submerso pela oscilação de maré

PRÉ-CAMBRIANO

- **pEgnaes** — COMPLEXO ILHA DA MADEIRA: ortoclásio-gnaisse, porfiróide, homogêneo a bandado em afloramentos restritos, cor verde acastanhado a cinzento. Mostra xenólitos grosseiros e migmatíticos
- **pEVm** — UNIDADE RIO NEGRO: migmatitos predominantemente estromáticos com paleossoma de biotita (-anfibólio) gnaisse a nebulito granular de tons fino-médio, em parte pegmatóide (m), transicionando para biotita-xisto(x), gnaisse oftalmítico, localmente blastomilonítico, com veios e glóbos granulometricamente distintos entre fino e médio mostrando aspecto por vezes brechóide em certas porções (g) e biotita-gnaisse porfiroblástico com elementos cenimétricos de microclina rosada (gp), protomilonito e milonito das litologias anteriores(mp)
- **pEvm** — Diques básicos intrudindo as rochas do embasamento
- **pEgr** — Granito róseo, isótropo, de granulação grosseira a média, porfirítico, com fenocristais de microclina e plagioclásio, textura rapakivi
- **pEsm** — Sienito róseo, isótropo, de granulação grosseira a média, porfirítico, com fenocristais de microclina e plagioclásio, textura rapakivi

AGRUPAMENTO II

- **pEsm** — Sienito róseo, isótropo, de granulação grosseira a média, porfirítico, com fenocristais de microclina e plagioclásio, textura rapakivi

AGRUPAMENTO I

- **pEmi** — UNIDADE TRÊS ILHAS: migmatitos com estrutura fáltica a listrada, com paleossoma escuro, geralmente de biotita fino, rico em biotita e anfibólio e neossoma granítico a cor cinza(g), associação não diferenciada de anfibolito gnaisse e biotita-anfibolito, ocorrências de rocha cloronoritóide (ch)
- **pEi** — BATÓLITO SERRA DOS ÓRGÃOS: biotita-anfibólio-granodiorito, granito cinzento claro a esbranquiçado, rosa médio, foliado, com xenólitos de biotita gnaisse

Limite de formações superficiais

Contato observado ou inferido em sequência rochosa, horizontal ou quase

Falha inversa, traços no bloco do teto, tracejada quando encoberta

Falha vertical ou tracejada, quando encoberta

Direção e mergulho de foliação metamórfica em rochas gnáissicas e migmatíticas, formação e basculamento em migmatitos, foliação cataclástica, foliação ígnea

Direção de foliação ou bandamento vertical

Direção e mergulho do plano axial de dobra similar

Fluxo e caimento do eixo de dobra similar

Direção de eixo de dobra similar horizontalizado

Fluxo e caimento do eixo de dobra paralela

Direção e caimento do eixo de dobra paralela a inclinação

Direção linear de orientação preferencial de feldspato (pf), porfiroclastos de feldspato (pf), porfiroclastos de quartzo (q), leucossoma (b), quadrantes de quartzo (q), leucossoma (b).

Direção linear de orientação preferencial de feldspato (pf), agrupamentos de quartzo (q), leucossoma (b).

Fluxo e caimento de eixo maior de agregados quartzo-feldspáticos (pf), estilólitas rochosas (s), agregados pinbolíticos (p)

Direção de eixo maior, horizontalizado, de agregados quartzo-feldspáticos (f), estilólitas rochosas (s)

Ocorrências rochosas
rc - Rocha calcissilicática
qt - Quartzito
mg - Micaxisto
kz - Gnaisse kinzigítico
ck - Rocha cloronoritóide
s - Sulfetos disseminados

Jazidas em atividade (⚒) ou paralizadas (⚒)
pdgn - Pedreira em rocha gnáissica
pg - Pegmatito
gr - Areia
ag - Argila
pdgr - Pedreira em rocha granítica
sgn - Sobrerra em rocha gnaissica